

ANALISIS:

CORTISOL EN SALIVA

AYUNO:

SI hs.

NO



PREPARACIÓN PREVIA:

Antes de la recolección de saliva debe retirar en el laboratorio el recipiente para juntar la muestra.

DETERMINACION DE CORTISOL EN SALIVA (recolección a las 7 hs.)

Al levantarse y **SIN** cepillarse los dientes enjuagarse la boca con agua y recolectar un mínimo de 2 ml. de saliva entre las 7 y las 8 hs. en el tubo provisto por el laboratorio (no exceder ese período de tiempo).

ANOTAR EN EL TUBO EL HORARIO DE RECOLECCIÓN.

RESGUARDAR LA MUESTRA EN LA HELADERA HASTA SU ENTREGA EN EL LABORATORIO

PERMANECER EN REPOSO DURANTE LA RECOLECCION

DETERMINACION DE CORTISOL EN SALIVA (recolección a las 23 hs.)

El paciente deberá concluir la cena a las 21 hs. luego **debe** cepillarse los dientes **sin dentífrico** y enjuagarse la boca con agua, dejar transcurrir 2 hs. sin ingerir ningún alimento.

Enjuagarse nuevamente la boca con agua y recolectar un mínimo de 2 ml. de saliva en el en el tubo provisto por el laboratorio. **ANOTAR EN EL TUBO EL HORARIO DE RECOLECCIÓN.**

RESGUARDAR LA MUESTRA EN LA HELADERA HASTA SU ENTREGA EN EL LABORATORIO

PERMANECER EN REPOSO DURANTE LA RECOLECCION

OBSERVACIONES

El tiempo empleado para la recolección de la muestra de saliva no podrá superar los 60 minutos.